

# Оценка целесообразности проведения генетического исследования у пациентов с подозрением на спинальную мышечную атрофию с дебютом

после 18 месяцев

Клинические признаки	Баллы	Да/Нет
<b>ОСНОВНЫЕ</b>		
Мышечная гипотония, более выраженная в проксимальных отделах нижних конечностей и тазовом поясе	2	
Приемы Говерса	1	
Тремор пальцев вытянутых рук	2	
Фасцикуляции языка и/или других групп мышц	2	
Отсутствие сухожильных рефлексов	1	
Ночная гиповентиляция/апноэ сна	1	
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ</b>		
Ретракция ахилловых сухожилий	0,25	
Сколиоз	0,25	
Псевдогипертрофии икроножных мышц	0,25	
Повышение уровня КФК до 2000 Ед/л	0,25	

СМА вероятно, если выполнены все три условия  
Есть хотя бы один основной признак  
Есть хотя бы один дополнительный признак  
Общая сумма баллов по основным и дополнительным признакам  $\geq 3$

**Сумма баллов**

ФИО врача \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Разработано по материалам: Шаркова И.В., Дадали Е.Л., Никитин С.С. Критерии диагностики спинальной мышечной атрофии 5q. Нервно-мышечные болезни. 2021;11(3):37-44.

Материал предназначен для медицинских и фармацевтических работников.

СР-311655 | апрель 2022

ООО «Джонсон & Джонсон»

Россия, 121614, Москва, ул. Крылатская, 17, корп. 2

Тел.: +7 (495) 755-83-57, факс: +7 (495) 755-83-58

Материал вспомогательного характера.